

Matemáticas de los cursos de electromagnetismo I y II en la Facultad de Ciencias, UNAM

E. Ley-Koo* y S. Palacios** Instituto de Física, UNAM



Resumen

Esta contribución está enfocada en la identificación y análisis de las matemáticas necesarias para cubrir adecuadamente los cursos de electromagnetismo, tomando en cuenta la falta de coordinación en los tiempos en que los alumnos, concretamente de la facultad de ciencias, toman las asignaturas de matemáticas y física; esta problemática requiere que se tome en cuenta que las matemáticas mismas han tenido motivaciones físicas y una vez desarrolladas han retroalimentado el estudio de los fenómenos naturales. La propuesta específica es que en los cursos de física se incorporen ambos aspectos, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje.

Física y Matemáticas

Mecánica

- Galileo
- Newton, leyes de la dinámica
- (PhilosophiæNaturalis Principia Mathematica) Fenómenos colectivos
- Calor, ondas y fluidos
- Bernoulli
- Leyes del electromagnetismo (A treatise on Electricity and Magnetism)
- Óptica
- Huygens; propagación de la luz
- Fresnel; difracción
- Relatividad
- especial
- general Mecánica Cuántica
- Heisenberg, Born, Jordan
- Schrödinger
- Pauli; espín del electrón
- Mecánica Cuántica Relativista, Dirac

El libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas

- Cálculo diferencial e Integral
- Series de Fourier
- ► Teoría cinética de los gases
- Ecuaciones de Maxwell
- Construcción de frentes de onda
- ► Integrales de Fresnel
- Espacio tiempo plano 4-D
- Espacio tiempo curvo, geometría riemanniana
- ► Formulación matricial
- Ecuación de Schrödinger
- ▶ Matrices de Pauli
- Ecuación de Dirac, Álgebras de Clifford

Matemáticas de Electromagnetismo I

Física Electrostática en el vacío

- Ley de Coulomb
- Principio de superposición
- Ley de Gauss (diferencial, integral y condiciones de frontera)
- Campo electrostático conservativo (diferencial, integral y condiciones de frontera)
- Potencial electrostático (energía)
- Equilibrio inestable de cargas eléctricas en campos eléctricos
- Desarrollo multipolar del potencial de Coulomb (por fuera y por dentro [4])
 - Magnetostática en el vacío
- Ley de Biot-Savart
- Ley de Ampère
- Ley de Gauss magnética (no existencia de monopolos magnéticos)
- Potencial vectorial (potencial de cantidad de movimiento)

Medios materiales

- Electrostática/magnetostática en dieléctricos/permeables
- momentos dipolares permanentes e inducidos
- polarización/magnetización permanente e inducida
- densidades de carga de polarización/magnetización volumétrica y superficial

Electrodinámica

- Ley de Faraday-Lenz-Henry (inducción magnetoeléctrica)
- Ley de Ampère-Maxwell
- Conservación de carga eléctrica

Conservación de energía

- Fuerza de Lorentz
- densidad volumétrica
- densidad de flujo de energía (vector de Poynting) Conservación de cantidad de movimiento
- densidad volumétrica
- ► flujo de cantidad de movimiento (tensor de esfuerzos de Maxwell)
- Potenciales electromagnéticos escalar y vectorial
- Ecuaciones de onda para potenciales y campos de fuerza
- con densidad de carga o corrientes como fuentes
- Ondas electromagnéticas con frecuencia definida; ondas planas (tranversalidad y polarización)

- Matemáticas
- ► Integración sobre líneas, superficies y volúmenes
- ► Teorema de Gauss (flujo, divergencia y caja de píldoras)
- ► Teorema de Stokes (circulación, rotacional y circuito de Stokes)
- ► Campo de gradiente (Ecuación de Poisson, Ecuación de Laplace y funciones armónicas)
- ▶ Teorema de Earnshaw
- ► Función generadora de armónicos esféricos puros y completos
- Campo rotacional
- Campo solenoidal
- ► Transformaciones de norma; norma transversal → ecuación de Poisson
- Corriente de desplazamiento
- Ecuación de continuidad
- ▶ Teorema de Poynting
- Extensión del teorema de Poynting
- Norma de Lorentz
- Ecuación de Helmholtz

Matemáticas motivadas por electromagnetismo

- Soluciones a la ecuación de Laplace
- separabilidad en una, dos y tres dimensiones y en cartesianas, cilíndricas y esféricas
- problemas: electrodos planos, paralelos e infinitos,
- cilindricos coaxiales infinitos y esféricos concéntricos
- Problemas de electrostática y magnetostática en dos dimensiones
- Ecuación de Poisson y condiciones de frontera
- Ley de Gauss y Ampère para fuentes rectas infinitas y uniformes
- Soluciones a la ecuación de Helmholtz homogénea (separabilidad en una, dos y tres dimensiones y en cartesianas, cilíndricas y esféricas)
- ► Funciones de Green (solución a la ecuación de onda con fuente puntual e instantánea)
- propagador retardado
- problemas de electrostática con condiciones de frontera de Dirichlet y Neumann

- Continuación analítica (Euler)
- Bases de funciones armónicas y sus superposiciones lineales [6]
- ▶ dos dimensiones: series de Fourier, transformadas integrales de Laplace
- ► tres dimensiones: series Fourier-Bessel, armónicos esféricos
- ▶ Teoremas de unicidad
- ► Funciones analíticas de variable compleja: condiciones de Cauchy Riemann, teorema de los residuos [5]
- ► Teorema de Helmholtz
- Bases de funciones de Bessel esféricas en todas sus variantes
- estacionarias
- viajantes (entrantes o salientes)
- modificadas con número de onda imaginario (ondas evanescentes)
- ▶ Desarrollo de Rayleigh de onda plana

Matemáticas de electromagnetismo intermedio

- Problemas de distribuciones de carga en presencia de conductores (planos, cilíndricos y esféricos, superficies equipotenciales y líneas de campo)
- Problemas de condiciones de frontera en presencia de dieléctricos/permeables
- ► Fuentes de radiación de ondas planas, cilíndricas y esféricas
- Ecuaciones de Jefimenko
- ► Campos de fuerza y de potencial de Liénard-Wiechert
- ► Función de Green de onda esférica saliente para fuente puntual

► Fenómenos electromagnéticos descritos en

- sistemas inerciales
- Principio de relatividad especial ► Principio de la constancia de la velocidad de la luz
- Consecuencias cinemáticas: ▶ transformaciones de Lorentz entre sistemas inerciales en
- el espacio-tiempo relatividad de la simultaneidad
- contracción longitudinal en la dirección del movimiento
- dilatación del tiempo
- ley de adición de velocidades
- intervalos (espacialoide, temporaloide y luminoide,
- cuadrado del intervalo espacio-temporal y de tiempo
- cuadrivector de velocidad
- Dinámica relativista
- cuadrivector de cantidad de movimiento-energía cuadrivector de fuerza-potencial (ecuaciones de
- movimiento) conservación de cantidad de movimiento y energía para un sistema aislado
- Electrodinámica
- cuadrivector de gradiente
- cuadridivergencia
- d'Alembertiano conservación de carga eléctrica, ecuación de continuidad
- norma de Lorentz ecuación de onda para potenciales con sus fuentes
- conexiones entre potenciales y campos de fuerza como su ► transformaciones de Lorentz (densidad de corriente y
- carga, potenciales electromagnéticos, de campos de fuerza y sus interpretaciones) cuadritensor de campo electromagnético ecuaciones de Maxwell (dependientes de las fuentes: Ampère-Maxwell y Gauss eléctrica, independientes de las
- fuentes: Gauss magnética y Faraday)[7] leyes de balance de cantidad de movimiento-energía

► Condiciones de frontera

- ► Funciones de Green
- ▶ Método de imágenes
- ▶ Desarrollo en términos de funciones armónicas
- ► Ecuaciones de Maxwell (condiciones de frontera)
- ▶ Generalización del teorema de Helmholtz para campos vectoriales dependientes de la posición y el tiempo
- ▶ Ecuación de Helmholtz
- Cuadrivectores ▶ Diagramas de espacios-tiempo
- Cuadrivector de intervalo ► Invariante de Lorentz (masa en reposo)

Espacios-tiempo de Minkowski

- Invariante cuadrivector de velocidad
- Energía en reposo como invariante de Lorentz Ortogonalidad entre 4-vectores de fuerza y de cantidad de
- movimiento Escalar y covariante
- cuadrivector de corriente y carga cuadrivector de potencial electromagnético

cuadritensor de campo electromagnético antisimétrico (seis

- componentes independientes)
- carga eléctrica invariante contracción de 4-vectores de fuentes y potenciales (escalar
- invariante, densidad volumétrica de energía) traza nula
- determinante
- cuadridivergencia del tensor de campo identidad de Bianchi (4-gradiente de tensor antisimétrico simetrizado)
- cuadritensor simétrico cuadrático en el campo electromagnético
- traza del tensor simétrico (obtenido por la contracción del 4-tensor de campo consigo mismo)

Recomendaciones

El reconocimiento de la retroalimentación histórica entre física y matemáticas proporciona de manera natural un método integral de la enseñanza, en el que se debe plantear la herramienta matemática en conjunto con la interpretación física en beneficio del aprendizaje de los alumnos.

PREGUNTAS?

Referencias

- Emilio Segrè. From falling bodies to radio waves. Freeman
- 2. Emilio Segrè. *From x-rays to quarks*. Freeman
- 3. L. Medina, E. Ley-Koo. Mathematics motivated by physics: the electrostatic potential is the Coulomb integral transform of the electric cherge density. Rev.Mex. Fis. 54. (2008) 153. 4. E. Ley-Koo, Araceli Góngora-T. El desarrollo multipolar por fuera y por dentro Rev.Mex. Fis. 34 (1988) 645
- 6. E. Ley-Koo. Rev.Mex. Fis. Desarrollos armónicos del potencial de Coulomb en coordenadas cilíndricas, parabólicas y esferoidales 39 (1993) 785 7. E. Ley-Koo. Rev.Mex. Fis. Maxwell equations in Lorentz covariant integral form. 52 (2006) 84

5. E. Ley-Koo. De las leyes de Gauss y Ampère al teorema de los residuos de Cauchy. Rev.Mex. Fis. 39 (1993) 617

eleykoo@fisica.unam.mx* palacios.spa@gmail.com**